I'm not a bot

Si has tenido relaciones sexuales sin utilizar ningún tipo de anticonceptivo, te contamos qué puedes hacer para evitar un embarazo no deseado y el contagio de una ETS. 14 Febrero 2024 | SexoConsigue un anticonceptivo de emergencia: es posible utilizar la píldora del día después, ya que este método podría ayudar a evitar un embarazo no deseado. Cuanto más rápido te tomes la píldora más efectividad tendrá, pero recuerda que no es un método anticonceptivo de uso habitual.También tienes el DIU de cobre como anticonceptivo de emergencia que puede ser insertado dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección anticonceptiva.Uso de la pastilla PrEP: si consideras que has estado expuesta al VIH, el uso de la pastilla PrEP es un tratamiento de emergencia que se utiliza para reducir el riesgo de contagio.Realiza exámenes para descartar cualquier ETS: pasadas 2 semanas de las relaciones sin protección, se recomienda que te hagan distintas pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. Las ETS no se quitan por sí solas, sino estas seguro de si te has contagiado realizarte una prueba.Hazte una prueba de embarazo, si es necesario: la prueba de embarazo en orina es más precisa si te la realizas entre 1 o 2 semanas después de que no te haya llegado tu periodo menstrual y si quieres hacerlo en sangre puedes hacerlo a los 6 días de haber tenido las relaciones sin protección. Ambas son eficaces, por lo que elige la que más te convenga; se recomienda hacerte dos por si las dudas.Elige un método de barrera y anticonceptivo: para tener sexo vaginal, oral o anal, considera que las personas deben cuidarse para evitar ETS y embarazos no deseados, por lo que utilizar el condón es lo mejor.Después de terminar las relaciones, acude al baño y orina. Puede ayudar a eliminar las bacterias de la uretra y el sistema urinario.Comunicadora social y periodista con más de 15 años de experiencia en periodismo y webs médicas especializadas. Una de mis especialidades es escribir contenido médico de alto valor para nuestros lectores.Creación: 16 Abril 2024 Actualización: 18 Julio 2024¿Necesitas ayuda?Elige tu provinciaÁlavaAlbaceteAlicanteAlmeríaAsturiasÁvilaBadajozBarcelonaBurgosCáceresCádizCantabriaCastellónCeutaCiudad RealCordobaCuencaGeronaGranadaGuadalajaraGuipúzcoaHuelvaHuescaIslas BalearesJaenLa CoruñaLa RiojaLas PalmasLeónLéridaLugoMadridMalagaMelillaMurciaNavarraOrensePalenciaPontevedraSalamancaSegoviaSevillaSoriaTarragonaTenerifeTeruelToledoValenciaValladolidVizcayaZamoraZaragoza Según la Organización Mundial de la Salud, cada día un millón de personas contrae una infección de transmisión sexual (también conocidas popularmente como enfermedades de transmisión sexual), y muchos casos son asintomáticos; si no se atienden, pueden provocar graves problemas de salud a largo plazo. Nosotras te decimos cuáles son las ETS más comunes, de manera general y en mujeres. De acuerdo con el portal Medline Plus las ETS son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual; este contacto puede ser por la vagina, oral o anal. Algunas infecciones, como el herpes o virus del papiloma humano, también se contagian por roces de piel a piel durante el sexo.Otras formas en las que es posible contraer una ETS es por medio del embarazo, al momento del parto, la lactancia, transfusiones de sangre o al compartir algún tipo de aguja.El Instituto Mexicano del Seguro Social en México dio a conocer datos acerca de que el 30% de las personas que están entre los 18 a los 30 años de edad han contraído o padecen actualmente una enfermedad de transmisión sexual.La forma más eficaz de saber si nos hemos contagiado de alguna ETS es por medio de un examen de detección en un centro de salud, de ser positivo el resultado también tendremos conocimiento de cuál es la infección a la cual nos vamos a enfrentar como el tratamiento adecuado. Todo esto debe ser con supervisión de un médico especializado.Estas enfermedades suelen ser asintomáticas, por lo cual es importante acudir periódicamente con tu ginecóloga y el uso de condón al mantener relaciones sexuales. También debemos estar muy al pendiente de cambios anormales que comience a presentar nuestro cuerpo. Estos son algunos síntomas que se pueden manifestar.Secreción inusual.Llagas o verrugas en nuestra zona genital o ampollas en la boca.Picazón.Enrojecimiento de la zona íntima.Olor diferente en la vagina.Sangrado anal o vaginal.Dolor abdominal.Según la OMS, 8 son los agentes patógenos de máxima incidencia en ITS. De ellos, 4 son curables en la actualidad: sífilis, gonorrea, clamidiosis y tricomoniasis. Las otras son infecciones víricas incurables: hepatitis B, infección por el virus del herpes simple (VHS), la infección por el VIH y la infección por el virus del papiloma humano (VPH).El portal de salud Healthline indica que las siguientes son las ETS más comunes en mujeres cisgénero y personas asignadas como mujeres al nacer. Una característica de la clamidia es que por lo general no presenta síntomas, por lo cual muchas veces las personas no son concientes de tenerla; cuando hay síntomas, puede tratarse de dolor al orinar. Hay que tener mucho cuidado porque si no se trata a tiempo podría provocar problemas de salud en el tracto genital, tracto urinario y los ojos, además de infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico. Esta enfermedad se cura con antibióticos, hay que recordar que aunque te haya dado una vez no significa que no puedas volver a contagiarte.Esta enfermedad es causada por el virus del herpes simple. Se manifiesta en la piel por medio de llagas en algunas zonas del cuerpo como genitales, glúteos, muslos o ano. Este virus no tiene cura pero hay medicamentos que ayudan a disminuir los brotes de llagas y la posibilidad de contagiar a otra persona. Usar condón es fundamental para que el riesgo sea menor. La bacteria presenta muy pocos síntomas cuando se contrae pero conforme va pasando el tiempo se puede presentar dolor al orinar y secreciones inusuales.Puede provocar problemas de salud graves como inflamación del útero e infertilidad; una mujer embarazada puede transmitir la infección a su hijo, además de que la infección puede provocar parto prematuro o ceguera al recién nacido. De acuerdo con un estudio sobre el VPH y el cáncer cervical, se han reconocido más de 200 tipos del virus, de los cuales alrededor de 40 infectan el tracto genital. A su vez, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos los divide en dos grupos, de bajo y alto riesgo.Si no se trata a tiempo es posible desarrollar varios tipos de cáncer, como el de cuello uterino.Leer más:Estos son los peligros de usar ropa interior de encaje a diarioLeer másCuantos tipos de virus del papiloma humano existenLeer másPor qué es importante usar condón durante el sexo oralLeer más El portal de planificación Planned Parenthood describe a la píldora anticonceptiva de emergencia como un método que previene el embarazo en relaciones sexuales efectuadas sin protección. Por su parte, la Clínica Mayo define a la pastilla del día siguiente como un anticonceptivo cuyo propósito es evitar la concepción cuando existieron prácticas de riesgo o cuando el anticonceptivo usado presenta fallas.Su uso se recomienda como de respaldo, debido a que no se trata de un método anticonceptivo de planificación que puede usarse a largo plazo por a las restricciones ocasionadas por las concentraciones que la fórmula tiene para el cuerpo de la mujer. ¿Cuántas veces puede tomarse la pastilla del día siguiente? Descúbrelo. Foto: PexelsDe acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se recomienda el uso de la ‘morning-after’ dentro de las primeras 72 horas siguientes a las relaciones sexuales sin protección. Esto, ya que conforme se tome con mayor prontitud alcanzará mayor efectividad.Transcurridas más de 72 horas, las posibilidades de éxito disminuyen al 75%, debido a que sus ingredientes compuestos no son capaces de interferir una vez que se efectuó la fertilización, en casos donde sí se logró el procedimiento.La pastilla del día siguiente no debe usarse como un método anticonceptivo de forma habitual ya que, según el IMSS, su alto contenido hormonal podría desencadenar alteraciones del ciclo menstrual así como diversos efectos secundarios, entre los que se encuentran náuseas, malestar general, migrañas y sensibilidad en las mamas.Cuídate Plus menciona que la pastilla del día siguiente no es efectiva si se toma previo a la relación sexual sin anticonceptivo, de modo que este fármaco únicamente surge efecto cuando se administra después del coito. Asimismo, debe administrarse con el mismo cuidado con el que se toman otros medicamentos, sin ingerir bebidas alcohólicas o combinarla con sustancias que puedan alterar sus efectos y volverlas poco fiables. Igualmente es necesario tener presente que ingredientes y algunos antibióticos también podrían mermar su eficacia.Las indicaciones generales de uso de la ‘morning-after’ son usarla en las primeras 72 horas posteriores al acto sexual de riesgo, no hacerlo bajo el influjo del alcohol o drogas y procurar no combinarla con el consumo de antibióticos. Foto: PexelsEl efecto de la pastilla dura entre 11 y 15 horas, explica la organización Reproducción Asistida. De esta manera, no es prudente considerar que esta pastilla brinda protección a largo plazo, por lo que es mejor usar anticonceptivos de barrera si se tienen relaciones inmediatamente después de haber tomado la pastilla del día siguiente.Tampoco se recomienda usarla como un método recurrente. La clínica Gineser sugiere que no se recomienda usar la pastilla del día siguiente más de dos veces en un año. Detalla que tomarla de manera frecuente puede alterar los periodos menstruales y aumentar la potencia de los efectos secundarios adversos, además, no protege ante infecciones de transmisión sexual; exclusivamente impide la concepción.El portal de Clue añade que se necesitan más y exhaustivas indagaciones que permitan determinar si hay efectos derivados de su consumo repetitivo. Hasta el momento no existe evidencia suficiente de que haya consecuencias irreversibles en el organismo si se consume en repetidas ocasiones a lo largo del año o en un mismo ciclo. El IMSS concluye en que no se aconseja su uso continuo debido a que, en comparación con otros métodos anticonceptivos, es considerablemente menos efectiva y otorga mayores efectos secundarios. Por lo que se sugiere acudir con un especialista que se encargue de determinar cuál es el anticonceptivo idóneo para cada ritmo de vida sexual.Leer más:Cuál es el olor de la vagina y cómo saber si algo no anda bienLeer más¿Puedes quedar embarazada si tienes sexo en la ducha?Leer másPor qué NO se deben usar dos condones al mismo tiempoLeer más ★★★★★Valoración: 2.66 (1199 votos) Si has tenido relaciones sexuales sin protección y te preocupa un posible embarazo, es importante actuar con rapidez y tomar medidas para prevenirlo. En este artículo, te explicaremos las diferentes opciones disponibles, incluyendo la píldora del día después, otros métodos anticonceptivos y consejos para protegerte de las enfermedades de transmisión sexual (ETS).Temas que Desarrollaremos La píldora del día después, también conocida como anticonceptivo de emergencia, es un medicamento que se toma después de tener relaciones sexuales sin protección para evitar un embarazo. Funciona principalmente interfiriendo con la ovulación o impidiendo que un óvulo fecundado se implante en el útero.Es importante destacar que la píldora del día después no es un método anticonceptivo regular y su efectividad disminuye con el tiempo. Para obtener los mejores resultados, debe tomarse lo antes posible después de la relación sexual, idealmente dentro de las primeras 24 horas.Otros Métodos Anticonceptivos de EmergenciaAdemás de la píldora del día después, existen otros métodos anticonceptivos de emergencia, como el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, que se puede insertar hasta cinco días después de la relación sexual sin protección.¿Cómo Evitar un Embarazo No Deseado?La mejor manera de evitar un embarazo no deseado es utilizar métodos anticonceptivos de forma regular y correcta. Entre las opciones más comunes se encuentran: Condones : Son una barrera física que previene el contacto directo entre los fluidos corporales y son el único método que protege contra las ETS. Pastillas anticonceptivas : Funcionan regulando el ciclo menstrual y evitando la ovulación. DIU : Se inserta en el útero y puede ser de cobre o hormonal. Implante : Se coloca debajo de la piel y libera hormonas para prevenir el embarazo. Inyección hormonal : Se administra cada tres meses y previene la ovulación.Consejos para Protegerte de las ETSLas enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se transmiten a través del contacto sexual. Para prevenirlas, es fundamental: Utilizar condones durante todas las relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. Realizarse chequeos regulares para detectar ETS. Hablar con tu pareja sobre tu historial sexual y las medidas de seguridad que ambos quieren tomar.Aquí te respondemos algunas de las preguntas más frecuentes sobre la píldora del día después :¿Dónde puedo conseguir la píldora del día después?La píldora del día después se puede obtener en farmacias, centros de salud y hospitales. En algunos países, también se puede adquirir en línea.¿Cuánto cuesta la píldora del día después?El precio de la píldora del día después varía según el país, la farmacia y la marca. En algunos casos, se puede obtener gratuitamente en los centros de salud.¿Qué efectos secundarios tiene la píldora del día después?La píldora del día después puede causar efectos secundarios como náuseas, vómitos, dolor de cabeza, sensibilidad en los senos y sangrado irregular.¿La píldora del día después afecta la fertilidad?La píldora del día después no afecta la fertilidad a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que es un método de emergencia y no debe utilizarse como método anticonceptivo regular.La píldora del día después puede ser una opción efectiva para prevenir un embarazo no deseado después de tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, es importante recordar que es un método de emergencia y que la mejor manera de evitar un embarazo no deseado es utilizar métodos anticonceptivos de forma regular y correcta.Recuerda que la salud sexual es un tema importante y que es fundamental hablar con un profesional de la salud si tienes alguna duda o preocupación.Si quieres conocer otros artículos parecidos a Qué tomar para no quedar embarazada después de tener relaciones puedes visitar la categoría Salud. Los métodos de prevención son indispensables para toda persona con vida sexual activa, ya sea para cuidarse de un embarazo no deseado o para disminuir el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Existen numerosas alternativas, que van desde las que funcionan como preventivos, es decir, cuyo uso se recomienda antes del acto sexual, hasta las que fungen como agentes posteriores al acto, tal es el caso de la pastilla PEP que evita el contagio de VIH. Conoce cuánto cuesta y cómo funciona la pastilla PEP, tratamiento que evita la transmisión de VIH.Foto: PexelsEl tratamiento PEP consiste en la profilaxis post-exposición, que de acuerdo con National Institutes of Health, significa prevención o control en la propagación de una infección o enfermedad con el uso de antirretrovirales. En el caso del PEP, funge como agente preventivo para reducir el riesgo en personas que hayan estado expuestas al VIH. Según información de MedlinePlus, esta pastilla únicamente es funcional en circunstancias de emergencia. Debe tomarse en las 72 horas posteriores a una posible exposición al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Si se inicia a tiempo el tratamiento, la pastilla de PEP es sumamente eficaz, con una tasa de efectividad de hasta 80%, indican cifras de Pan American Health Organization. Asimismo, reitera que la primera toma no basta para obtener resultados satisfactorios. Es necesario seguir el plan médico que consta de 28 días. Una vez finalizado, lo ideal es acudir a una consulta para evaluar si su comportamiento en el organismo fue exitoso para detener o evitar la transmisión por VIH. El Centro para Control y Prevención de Enfermedades explica que el PEP no sustituye el uso de otros métodos para prevenir el contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Además de que no se sugiere usarlo como alternativa fija para quienes tienen exposición al virus recurrente. Sobre los efectos secundarios, organizaciones de salud aseguran que únicamente se conocen síntomas leves de baja importancia.Foto: PexelsEl Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida informó que el suministro del PEP se trata de una estrategia de prevención para reducir el índice de casos positivos. Cualquier persona que haya estado expuesta o que tenga sospechas de haber vivido una práctica de riesgo a contraer VIH puede solicitar dar inicio a este tratamiento antirretroviral. En México la pastilla de PEP para evitar el contagio de VIH es un servicio que se proporciona de forma gratuita. Puede solicitarse en hospitales y clínicas públicas que cuenten con jornadas de prevención de manera permanente o en campañas de salud periódicas. En otros países existen restricciones para acceder a ella sin ningún costo, como caso de agresiones sexuales o exposiciones accidentales en el trabajo. Datos de Consumer Reports reiteran que en Estados Unidos, el costo por tratamiento para quienes no cuentan con seguro médico puede ascender a los mil 800 dólares.Leer más: El producto de ‘limpieza’ íntima que NO debes usarLeer más¿Qué pasa si usas un condón caducado?Leer másPor qué no existe una pastilla anticonceptiva para hombresLeer más En la actualidad, las redes sociales están repletas de una amplia variedad de consejos para bajar de peso; sin embargo, la tendencia sobre contar las calorías de los alimentos sigue siendo una de las más populares. Pero, si perder peso está entre tus objetivos, ¿por qué deberías dejar de contar las calorías y buscar ayuda profesional? Muchos autoproclamados expertos en plataformas como Instagram y TikTok sostienen que la pérdida de peso se reduce a un simple cálculo: calorías consumidas frente a calorías quemadas. Por lo que es esencial evaluar los supuestos beneficios como los riesgos asociados a esta práctica.NOSOTRAS te compartimos información especializada acerca de por qué contar las calorías de tus alimentos podría ser un hábito poco saludable.Foto: Freepik. Las calorías son unidades de medida que expresan el valor nutricional de los alimentos según su contenido energético, y son necesarias para mantener funciones vitales. Sin embargo, el conteo de calorías se ha vuelto un recurso común en la cultura de las dietas para perder peso. Según David Gaviria, especialista en nutrición para CNET, “contar calorías no es algo natural. Comemos alimentos, no calorías”. Aunque algunas personas, como los atletas, pueden beneficiarse de este método con ayuda profesional, la mayoría lo utiliza para manipular su peso, lo que puede llevar a conclusiones erróneas.Tradicionalmente, se ha enseñado que perder peso es cuestión de matemáticas simples: que reducir ciertas calorías equivale a perder ciertos kilos. Sin embargo, esto ha sido refutado por expertos. Fatima Cody Stanford, especialista en obesidad y profesora en la Facultad de Medicina de Harvard, afirma: “esta idea de ‘una caloría que entra y una caloría que sale’ no solo es anticuada, sino que es errónea”. Factores como el tipo de alimento, el metabolismo individual y la microbiota intestinal influyen significativamente en cómo el cuerpo quema y utiliza las calorías.De acuerdo con Harvard Health Publishing, la forma en que procesamos las calorías está influenciada por tres factores principales.El microbioma intestinal. En el intestino viven billones de organismos, y su composición puede afectar la cantidad de calorías que se absorben de los alimentos. Los estudios muestran que las personas en general tienen diferentes tipos de microbiota y que esta puede modificarse en relación al peso de cada persona. Esto se debe a que ciertos organismos pueden descomponer y utilizar más calorías de algunos alimentos.Tu metabolismo. Cada cuerpo tiene un “punto de ajuste” que regula el peso, influenciado por genes, entorno y comportamientos. Stanford explica que el hipotálamo controla este punto, evitando que el peso baje de ese nivel, lo que podría dificultar la pérdida de peso. Esto explica por qué el 96% de las personas que pierden peso significativamente tienden a recuperarlo.El tipo de alimentos que consumes. Las elecciones alimenticias afectan la ingesta calórica, no solo por su contenido calórico. Un estudio de 2019 en Cell Metabolism mostró que los alimentos procesados pueden incitar a consumir más calorías. Stanford comenta: “las personas que consumieron alimentos ultraprocesados fueron quienes aumentaron de peso. En promedio, quienes comieron alimentos procesados consumieron 500 calorías más al día que aquellos que comieron alimentos no procesados”.Foto: Freepik. Aunque algunas personas pueden contar calorías de manera segura, esta práctica también está relacionada con trastornos de la conducta alimentaria. Un estudio de 2017 reveló que el 75% de los participantes diagnosticados con un trastorno alimentario utilizaban aplicaciones para contar calorías, y el 73% creía que estas aplicaciones contribuían a sus síntomas. La evidencia sugiere que el conteo de calorías puede llevar a una restricción de alimentos que va más allá de lo saludable, fomentando una relación negativa con la comida.“Las investigaciones sobre el seguimiento de calorías demuestran que puede poner a las personas en riesgo de sufrir trastornos alimentarios o de un seguimiento compulsivo”, explica Gaviria. Es crucial que cada persona reconozca su relación con la comida y el seguimiento de calorías, considerando cuándo esta práctica puede volverse perjudicial. Si decides contar calorías, es crucial reconocer cuándo esta práctica se vuelve perjudicial. Experimentar culpa, vergüenza o ansiedad al respecto son señales de alarma, por lo que se vuelve imprescindible buscar ayuda profesional. La experta para CNET enfatiza en que “si te invitan a salir a comer y lo primero que piensas es en tu ventana calórica, eso es una gran señal de que debes reconsiderar lo que estás haciendo”.La ingesta calórica necesaria varía según el individuo. Limitar las porciones y optar por alimentos no procesados son estrategias más sostenibles que simplemente contar calorías. En lugar de obsesionarte con los números, enfócate en la calidad de tu dieta y en hacer cambios de estilo de vida que promuevan una relación saludable con la comida. Como señala la especialista de Harvard, “es hora de dejar de lado la idea de las calorías” y comenzar a disfrutar de una alimentación consciente y equilibrada.Foto principal: Freepik.Leer más:Darte permiso para comer también es un trastorno alimenticioLeer másPor qué los trastornos alimentarios son más comunes en mujeresLeer más La seguridad es algo que concierne a todas las personas involucradas en una relación sexual, no solamente para evitar un embarazo no deseado sino para prevenir una infección de transmisión sexual. Para eso, descubre las cosas que SIEMPRE debes revisar al usar condón externo con tu pareja. Podemos llegar a pensar que sabemos cómo usar un condón externo de forma correcta, pero basta un pequeño descuido para cometer un error que nos deje expuestas a infermedades de transmisión sexual (ITS) o embarazos no planeados.Los condones externos son uno de los métodos anticonceptivos más populares, por su efectividad que va del 85% al 95%. Es un método que se distingue porque brinda protección para infecciones, lo cual no sucede con los otros métodos anticonceptivos. El condón externo también es comúnmente llamado condón masculino; aunque tú no seas quien lo usa directamente, la protección es algo que también te concierne a ti. Como lo explica la plataforma de salud del gobierno de Oklahoma (en Estados Unidos), es importante la planeación en pareja en cuanto a los condones. Hablen sobre métodos anticonceptivos y sobre protección ante enfermedades. Foto: Pexels. Cottonbro StudioLos condones externos sí caducan, siempre debe tener impresa y visible la fecha de expiración. Si se pasa de la fecha, debes desechar ese condón externo y conseguir uno nuevo. En el empaque puedes checar agujeros o desgarres que tenga el condón, los cuales pueden dañar la integridad del producto. Si es así, deséchalo de inmediato. Es importante checar igualmente que el empaque del condón cerrado haga una especie de “colchón”, lo que significa que no está ponchado.Como lo comenta Upasana Kamineni Konidela, fundadora de Apollo Hospitals (India) en su canal de YouTube, otra de las cosas que SIEMPRE debes revisar al usar condón externo con tu pareja es que eviten usar los dientes, uñas o cualquier objeto puntiagudo para abrir el empaque, pues puedes dañarlo accidentalmente.Los condones externos tienen un lado en el que se desenvuelve sin problema. Ponerlo de manera incorrecta es un error muy común. Pero, ¡ten cuidado! Ya no debes reutilizar el condón externo que has puesto de manera incorrecta. Es muy importante que deseches ese condón externo y comiences el procedimiento de nuevo. Esto debido a que la parte exterior del condón ya habrá tocado los genitales de tu pareja, dejándote expuesta.Es importante que, cuando tu pareja se ponga el condón externo, se debe presionar la punta del mismo para sacar todo el aire dejando un espacio para la eyaculación. De otra manera, se puede llegar a romper el condón externo.Si el condón se ve como un globo inflado en la punta, hay que dejar salir el aire.Está bien usar lubricante, pero es importante utilizar productos hechos para este propósito y que no puedan causar daño en el condón; los lubricantes a base de aceite pueden tener un efecto nocivo en el condón. Bajo ninguna circunstancia tu pareja puede quitarse el condón durante el acto sexual sin que tú lo sepas. Si lo hace, se trata de un acto de violencia llamada ‘stealthing’. Una recomendación que da el gobierno de Oklahoma es siempre hablar con tu pareja sobre los condones antes de empezar a tener relaciones para tener acuerdos mutuos sobre cómo va a ser la dinámica. Recuerda que todo debe ser consensuado, NO estás obligada a acceder a tener relaciones sexuales sin protección si no estás de acuerdo con eso.Otra recomendación es no llevar el condón contigo en un lugar donde se dañe. Según explica la organización Brook, los condones pueden calentarse cuando están en una cartera, bolso o bolsillo y esto los daña.Recuerda que NO se debe reusar un condón y que es necesario cambiarlo cuando vas a cambiar de práctica sexual; por ejemplo, de la penetración vaginal a penetración anal o viceversa. Igualmente, no se deben compartir los condones cuando se usan condones externos en los juguetes sexuales como vibradores. Si se involucra a más personas, se debe usar uno nuevo para cada integrante de una relación.Leer más:Por qué NO se deben usar dos condones al mismo tiempoLeer más¿Qué pasa si usas un condón caducado?Leer másLo que debes saber antes de hacerlo sin condónLeer más Tener relaciones sexuales sin protección puede ser una situación estresante y preocupante. Si bien lo ideal es siempre usar algún método anticonceptivo para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, a veces ocurren imprevistos.En caso de haber tenido relaciones sin protección, es importante tomar medidas de inmediato para reducir el riesgo de embarazo y enfermedades de transmisión sexual. En este artículo, te explicaremos qué tomar después de tener relaciones sin protección y cómo actuar en caso de emergencia.ÍndiceExisten diferentes opciones anticonceptivas de emergencia que pueden tomarse después de tener relaciones sin protección. A continuación, te explicamos cuáles son:1. Píldora anticonceptiva de emergenciaLa píldora anticonceptiva de emergencia es una pastilla que se debe tomar lo antes posible después de haber tenido relaciones sin protección. Esta pastilla contiene una alta dosis de hormonas que impiden la ovulación y evitan que el espermatozoide fecunde al óvulo.Es importante tener en cuenta que la píldora anticonceptiva de emergencia no protege contra enfermedades de transmisión sexual y no es un método anticonceptivo regular. Solo se debe usar en situaciones de emergencia.2. Dispositivo intrauterino (DIU) de cobreEl DIU de cobre es un método anticonceptivo que se coloca en el útero y puede prevenir el embarazo hasta cinco días después de haber tenido relaciones sin protección. Este método es más efectivo que la píldora anticonceptiva de emergencia, pero requiere una visita al médico para su colocación.3. Anticonceptivos de emergencia de larga duraciónExisten otros métodos anticonceptivos de larga duración que pueden prevenir el embarazo hasta cinco días después de haber tenido relaciones sin protección, como los implantes hormonales y las inyecciones anticonceptivas. Estos métodos requieren de una visita al médico para su colocación y solo deben ser utilizados en situaciones de emergencia.¿Cómo actuar en caso de emergencia?Si has tenido relaciones sin protección y necesitas tomar medidas de emergencia, es importante que actúes lo antes posible. Aquí te dejamos algunos consejos para saber cómo actuar:1. Consulta a un médicoLo ideal es que acudas a un médico lo antes posible para que te recomiende el mejor método anticonceptivo de emergencia según tu situación. En caso de que no puedas acudir a un médico, puedes acudir a una farmacia para obtener la píldora anticonceptiva de emergencia.2. Toma la píldora anticonceptiva de emergencia lo antes posibleLa píldora anticonceptiva de emergencia debe ser tomada lo antes posible después de haber tenido relaciones sin protección. Cuanto antes la tomes, mayor será su efectividad.3. Usa métodos anticonceptivos regularesDespués de haber tomado medidas de emergencia, es importante que comiences a usar métodos anticonceptivos regulares para prevenir futuras situaciones de riesgo.ConclusiónTener relaciones sin protección puede ser una situación estresante y preocupante. Sin embargo, existen medidas de emergencia que puedes tomar para prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Es importante que acudas a un médico lo antes posible y comiences a usar métodos anticonceptivos regulares para prevenir futuras situaciones de riesgo.Preguntas frecuentes1. ¿La píldora anticonceptiva de emergencia es efectiva?Sí, la píldora anticonceptiva de emergencia es efectiva si se toma lo antes posible después de haber tenido relaciones sin protección. Sin embargo, su efectividad disminuye si se toma después de las primeras 72 horas.2. ¿La píldora anticonceptiva de emergencia tiene efectos secundarios?Sí, la píldora anticonceptiva de emergencia puede tener efectos secundarios como náuseas, mareos, dolor de cabeza y cambios en el período menstrual.3. ¿El DIU de cobre puede causar infertilidad?No, el DIU de cobre no causa infertilidad. Después de retirar el DIU, la fertilidad vuelve a su estado normal.4. ¿La píldora anticonceptiva de emergencia protege contra enfermedades de transmisión sexual?No, la píldora anticonceptiva de emergencia solo previene el embarazo y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Es importante usar métodos anticonceptivos y protección en todas las relaciones sexuales para prevenir enfermedades de transmisión sexual.5. ¿Qué métodos anticonceptivos son más efectivos?Los métodos anticonceptivos más efectivos son aquellos que se usan de manera regular y constante, como la píldora anticonceptiva, el DIU y los preservativos. Es importante elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Anticonceptivas: ¿Cuándo actúan? Descubre su efectividad Conoce pros y contras del condón femenino: guía completa La pastilla del día siguiente: tu opción anticonceptiva de emergencia Descubre la verdad detrás del picor en el cuero cabelludo sin caspa Descubre las causas de la comezón en los labios genitales Embarazo inesperado tras pastilla del día siguiente: ¿qué hacer? Nacimiento prematuro: ¿Cómo afecta al bebé nacer a las 36 semanas? Ovarios poliquísticos: ¿Por qué no me baja el periodo? ¿Sientes una bola en la garganta? Descubre las posibles causas 5 pasos a seguir después de mantener relaciones sexuales para cuidar tu higiene y tu salud íntima / Foto De Personas Creado Por Cookie_Studio - Www.freepik.es Tener una vida sexual satisfactoria, activa y saludable va más allá de experimentar la idea de placer inmediato al que está ligado. Cuidar de nuestra higiene y nuestra salud íntima es imprescindinble para evitar infecciones y disfrutar de la plenitud de los encuentros sexuales. Las infecciones u otros problemas derivados de la practica sexual son más frecuentes en mujeres, aunque también pueden desencadenarse en los hombres. El problema es que, muchas veces, existe mucho desconocimiento en torno a este tema y todo lo referente a la educación y la salud sexual. Para aportar un grano de arena, a continuación, damos algunas pautas respaldadas por expertos que debes considerar inmediatamente después de cada momento de placer con tu pareja. Durante el acto, pueden entrar bacterias e instalarse en el tracto urinario de la mujer provocando problemas como la cistitis. Orinar ayudar disipar cualquier bacteria o toxina ya que expulsas al exterior los gérmenes que están dentro. En el caso de los hombres, orinar puede contribuir a la prevención de la uretritis de transmisión sexual, producidas por el mismo contacto. No ocurre nada si después del sexo no tomamos baño, sin embargo sobre todo en el caso de las mujeres y hombres con piel muy sensible o las chicas propensas a infecciones íntimas, lo mejor es tomar un baño y lavar bien los genitales. Lavar siempre con un jabón especial para el área íntima con PH neutro. Evitar los lavados excesivos con productos que pueden ser nocivos para la zona íntima, como los geles corporales que no son específicos para el área genital. Estos alteran el pH de la zona vaginal y pueden ocasionar sequedad y otras lesiones. Asimismo, evita lavarte internamente de manera muy frecuente, puedes producirte más infecciones ya que eliminas la flora vaginal normal. En el caso de los hombres, lavar el pene con agua tibia todos los días al ducharse o bañarse, además de tras el acto sexual, prestando especial atención a la zona bajo el prepucio para evitar que se acumule esmegma, un agente antibacteriano que actúa también como lubricante. Lavate las manos con jabón es la mejor manera de eliminar bacterias que puedas adquirir durante el sexo, tocando los genitales de tu compañero/a, con ello evitaras que se extiendan las infecciones. Utilizar ropa íntima con telas de algodón, y evitar aquellas que son sintéticas o muy ajustadas, puesto que producen mayor sudoración, y esto altera la microbiota vaginal. Es bueno tener un vaso con agua en el dormitorio para tomar un poco después de tener relaciones sexuales. Beber por lo menos un vaso con agua después del sexo puede ayudarte a hidratarte y mantener tus niveles de energía altos, ya que la estimulación sexual puedes agotar la fuerza. También puede ayudarte a eliminar las bacterias de las vías urinarias. Cuidar tu salud y evitar un embarazo no deseado son aspectos muy importantes a la hora de tener encuentros íntimos. Si tu pareja y tú tuvieron sexo y no utilizaron ningún método de barrera ni anticonceptivo, te decimos lo que debes hacer después de tener relaciones sexuales sin protección.Te explicamos cómo debes actuar y qué acciones tomar inmediatamente después de la relación sexual y los días o semanas posteriores. Trata de estar tranquila porque aún hay acciones que puedes llevar a cabo para evitar un embarazo y detectar una enfermedad de transmisión sexual.Foto: Unsplash. Reproductive Health SuppliesDespués de que termine la relación sexual, ve al baño y haz pipí. De acuerdo con la Universidad de Colorado en Boulder, esto puede ayudar a eliminar las bacterias de la uretra y el sistema urinario. Así puedes evita que se desarrolle una infección del tracto urinario; según la empresa proveedora de salud Livi, las mujeres tienen 30 veces más probabilidades de desarrollar este tipo de infección.Si no utilizaste un método de barrera y tampoco tienes algún otro método anticonceptivo, es posible tomar una pastilla de emergencia o del día siguiente. Este método sirve para prevenir un embarazo, en caso de que no esté entre tus planes. Aunque puedes tomarla al día siguiente de la relación sexual, entre más rápido la consigas es mejor. Sin embargo, lo mejor es consultar a tu ginecóloga previamente. Aquí te contamos cómo se utilizan.Recuerda que estas pastillas NO deben ser tu método de anticoncepción regular, son para casos de emergencia. También existe otro método para la anticoncepción de emergencia: el dispositivo intrauterino de cobre (DIU). De acuerdo con el portal Livi, el DIU de cobre debe ser insertado por un profesional de la salud dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual sin protección. Pero reiteran que, entre más pronto se coloque, es más efectivo.Si crees que pudiste haber estado expuesta al VIH, considera el uso de la pastilla PEP. Es un tratamiento de emergencia que se utiliza para reducir el riesgo de contagio. Se toma como parte de un plan médico y es importante consultar a tu especialista sobre su uso. Aquí te contamos más sobre este tratamiento.Después de dos semanas, se recomienda que acudas a un hospital para que te hagan distintas pruebas de detección de enfermedades de trasmisión sexual. Por ejemplo, clamidia, gonorrea y sífilis. Si tienes síntomas como dolor, picazón, ardor o presentas secreciones o sangrados vaginales, acude al médico de inmediato. También se recomienda que tu pareja se haga el examen para descartar cualquier padecimiento.Foto: Pexels. Los Muertos CrewAsimismo, a los seis meses te recomendamos hacerte otra vez estos exámenes, ya que algunas enfermedades no se desarrollan en las primeras semanas.Si tienes un retraso de varios días y ya pasaron más de dos semanas del encuentro sin protección, debes hacerte una prueba de embarazo casera o de sangre. Ambas son eficaces, por lo que elige la que más te convenga; se recomienda hacerte dos por si las dudas.Por último, para tener sexo vaginal, oral o anal, considera que las personas deben cuidarse para evitar ETS. Para esto, se recomienda el uso del condón externo. Para evitar embarazos también existen diferentes métodos anticonceptivos como el condón, pastillas anticonceptivas, dispositivos, implantes, inyecciones o parche, cualquiera de estos te ayudará a evitar un embarazo no deseado. Consulta a tu ginecóloga sobre cuál es el más adecuado para ti. Foto: Pexels. Cottonbro StudioLeer más:Cuáles son las ETS más comunes en mujeresLeer másCosas que SIEMPRE debes revisar con tu pareja al usar el condón externoLeer másVacuna contra el VPH: a partir de qué edad es recomendable aplicarlaLeer más La sexualidad tiene un papel muy importante en la satisfacción personal y de pareja, pero como con otras actividades existen riesgos derivados de malas prácticas higiénicas. Por ejemplo, “resulta conveniente, tanto en el hombre como en la mujer, orinar tras una relación sexual”, adelanta Ignacio Moncada, jefe de Urología y de la Unidad del Varón del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela. ¿Qué es lo primero que se aconseja hacer tras una relación sexual? “Lo primero que se recomienda es orinar, ya que favorece la eliminación de las bacterias con las que se haya podido tener contacto durante el acto sexual. Además, beber agua ayudará, tanto a provocar las ganas de ir al servicio como a la hidratación del cuerpo a nivel general”, explica Fernando Losa, ginecólogo de la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y colaborador de Procare Health. “Al hacerlo se arrastran y se ‘lavan’ posibles bacterias que pueden entrar en el tracto urinario en la mujer, y así evitar las incómodas cistitis que ocurren tras una relación sexual. En el varón, miccionando justo después de la relación se evitan las uretritis de transmisión sexual que pueden producirse tras el contacto sexual”, especifica Moncada. Otras recomendaciones Tras la orina, indica Losa, “lo ideal es siempre lavar tanto la zona genital como las manos, cara o cualquier zona que haya estado en contacto con los órganos sexuales. Lo más recomendable es emplear un jabón específico para el área genital con agua templada que, además de limpiar la zona, ayudará a refrescarla y restablecer el pH espec