

I'm not a robot





























Nebaciderme® também é indicado para prevenir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas.Como o Nebaciderme funciona?Nebaciderme® contém dois antibióticos, a neomicina e a bacitracina zinca, que juntos inibem o crescimento de vários tipos de bactérias, principalmente as que costumam causar infecções de pele e de mucosas. Por isto, Nebaciderme® é eficaz para tratar e para prevenir infecções de pele e de mucosas.Os efeitos do Nebaciderme® começam logo após sua aplicação. Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. Contudo, a resposta ao tratamento depende, dentre outros fatores, do tamanho e tipo da lesão e da defesa do organismo do paciente. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.Contraindicação do NebacidermeVocê não deve usar Nebaciderme® se tiver alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e outros componentes da fórmula.Você também não deve usar Nebaciderme® se tiver perda da função dos rins (insuficiência renal grave) ou se você já teve ou tem problemas de audição ou de equilíbrio (sistema labiríntico). Não deve ser utilizada durante a gravidez ou a amamentação.Este medicamento está contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.Como usar o Nebaciderme?Aplique uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze.Mantenha o tratamento por mais 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido. Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue, quando você aplicar Nebaciderme® em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias).Posologia do NebacidermeAntes de você aplicar o produto, lave a região afetada com água e sabão, e seque cuidadosamente o local. Depois da aplicação, você pode proteger a região tratada com gaze.Você deve abrir o tubo desrosqueando a tampa. Fure o tubo com a ponta que está na própria tampa.Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.O que devo fazer quando eu me esquecer de usar o Nebaciderme?Caso você tenha esquecido de aplicar uma dose, aplique o medicamento assim que possível. Se estiver muito perto do horário da próxima dose, aguarde e aplique somente uma única dose. Não aplique duas doses ao mesmo tempo ou uma dose extra para compensar a dose perdida.Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.Precauções do NebacidermeSe você tiver doenças neuromusculares, como por exemplo, Myasthenia gravis e utilizar medicamentos relaxantes musculares ao mesmo tempo, somente use Nebaciderme® após a avaliação do seu médico.Se você já usou antibióticos aminoglicosídeos (por exemplo, a canamicina e/ou a estreptomincina) ou se você usa ao mesmo tempo Nebaciderme® e outros antibióticos aminoglicosídeos, somente use Nebaciderme® após a avaliação do seu médico, pois pode haver uma maior chance de aparecerem efeitos colaterais.Se você aplicar Nebaciderme® em grandes feridas na pele, pode haver uma maior absorção do medicamento para o sangue. Nos casos em que esta absorção é muito grande, e principalmente se você já tem problemas na função dos rins, ou se você usa outros medicamentos que podem alterar a função dos rins ou da audição, podem ocorrer eventualmente problemas nos rins ou de audição.Nebaciderme® não deve ser usado nos olhos.Reações Adversas do NebacidermeReação comum (gt. 1/100 e lt. 1/10): Podem ocorrer reações alérgicas locais, limitadas ao local de aplicação em cerca de 1,5% dos pacientes.Quando o medicamento é utilizado de forma correta, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico, pois a dose recomendada é baixa.Porém, em alguns casos, quando o medicamento é usado em doses muito altas ou quando há um excesso da absorção de neomicina para o sangue, isto pode alterar a função dos rins, a audição e/ou o equilíbrio (sistema labiríntico). Quando o paciente já tem alteração na função dos rins, há a possibilidade de ocorrer um acúmulo de antibióticos no sangue, que, em alguns casos, afeta a audição. Podem ocorrer paralisias parciais dos músculos, sensação de formigamento e dores musculares. O médico deve ser avisado quanto ao aparecimento dos seguintes sintomas: coceira, vermelhidão corporal e/ou facial (rash), inchaço ou quaisquer sintomas não notados anteriormente ao tratamento e perda auditiva (casos raros).Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informar também a empresa através de seu serviço de atendimento.População Especial do NebacidermeGravidez e amamentaçãoSe você estiver grávida, não deve utilizar este medicamento sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.Pacientes idososNão há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso de Nebaciderme® caso você seja idoso.Composição do NebacidermeCada grama da pomada contémSulfato de neomicina5 mg (equivalente a 3,5mg de neomicina base)Bacitracina zinca250 UIExipientes q.s.p.1,0 Excipientes:petrolato branco e butil-hidroxitolueno.Apresentação do NebacidermeBisnagas de 10 g – Embalagem com 1 ou 50 bisnagasUso tópico.Uso adulto e pediátrico.Superdosagem: pouco provável que ocorra uso quadro de intoxicação com o uso do Nebaciderme®, quando as doses e a forma de aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, caso o medicamento seja usado em quantidade excessiva, lave a região imediatamente com água e sabão neutro, e seque com gaze ou pano limpo. Procure assistência médica, caso apareçam reações indesejáveis.Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações.Interação Medicamentosa do NebacidermeEvite o uso simultâneo de outros medicamentos, tais como os antibióticos aminoglicosídeos, as cefalosporinas, a anfotericina B, a ciclosporina, o metotexifurano e os diuréticos de alça, pela possibilidade de afetarem os rins e a audição. Os antibióticos aminoglicosídeos, como a neomicina, podem potencializar o efeito dos relaxantes musculares.Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.Conserve o produto na embalagem original e a temperatura ambiente (15°C a 30°C) protegido da luz e umidade.Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.Características físicas e organolépticas do produto Nebaciderme® é uma pomada homogênea, livre de grânulos e partículas estranhas.Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.Dizeres Legais do NebacidermeReg. M.S. nº 1.1819.0033Farm. Resp. Filipe Thomas Steger - CRP-RS 10473MULTILAB Ind. e Com. de Prod. Farm. Ltda. RS 401 - km 30 - nº 1009 - São Jerônimo - RS CEP 96700-000 - CNPJ 92.265.552/0001-40 Indústria Brasileira SAC 0800 600 0660

Nebaciderme® também é indicado para prevenir infecções de pele e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas.Como o Nebaciderme funciona?Nebaciderme® contém dois antibióticos, a neomicina e a bacitracina zinca, que juntos inibem o crescimento de vários tipos de bactérias, principalmente as que costumam causar infecções de pele e de mucosas. Por isto, Nebaciderme® é eficaz para tratar e para prevenir infecções de pele e de mucosas.Os efeitos do Nebaciderme® começam logo após sua aplicação. Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. Contudo, a resposta ao tratamento depende, dentre outros fatores, do tamanho e tipo da lesão e da defesa do organismo do paciente. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.Contraindicação do NebacidermeVocê não deve usar Nebaciderme® se tiver alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e outros componentes da fórmula.Você também não deve usar Nebaciderme® se tiver perda da função dos rins (insuficiência renal grave) ou se você já teve ou tem problemas de audição ou de equilíbrio (sistema labiríntico). Não deve ser utilizada durante a gravidez ou a amamentação.Este medicamento está contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.Como usar o Nebaciderme?Aplique uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze.Mantenha o tratamento por mais 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido. Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue, quando você aplicar Nebaciderme® em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias).Como usar Antes de você aplicar o produto, lave a região afetada com água e sabão, e seque cuidadosamente o local. Depois da aplicação, você pode proteger a região tratada com gaze.Você deve abrir o tubo desrosqueando a tampa. Fure o tubo com a ponta que está na própria tampa.Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico.Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? Se você estiver grávida, não deve utilizar este medicamento sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.Pacientes idosos: Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso de Nebaciderme® caso você seja idoso.Uso com outras substâncias: Evite o uso simultâneo de outros medicamentos, tais como os antibióticos aminoglicosídeos, as cefalosporinas, a anfotericina B, a ciclosporina, o metotexifurano e os diuréticos de alça, pela possibilidade de afetarem os rins e a audição. Os antibióticos aminoglicosídeos, como a neomicina, podem potencializar o efeito dos relaxantes musculares. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento? Conserve o produto na embalagem original e a temperatura ambiente (15°C a 30°C) protegido da luz e umidade. Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características físicas e organolépticas do produto Nebaciderme® é uma pomada homogênea, livre de grânulos e partículas estranhas. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Aplique uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze. Mantenha o tratamento por mais 2 a 3 dias, após os sintomas 23 terem desaparecido. Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue20, quando você aplicar Nebaciderme® em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias). Como usar Antes de você aplicar o produto, lave a região afetada com água e sabão, e seque cuidadosamente o local. Depois da aplicação, você pode proteger a região tratada com gaze. Você deve abrir o tubo desrosqueando a tampa. Fure o tubo com a ponta que está na própria tampa. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas23, procure orientação médica ou de seu cirurgião-dentista.O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? Caso você tenha esquecido de aplicar uma dose, aplique o medicamento assim que possível. Se estiver muito perto do horário da próxima dose, aguarde e aplique somente uma única dose. Não aplique duas doses ao mesmo tempo ou uma dose extra para compensar a dose perdida. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR? Reação comum (> 1/100 e < 1/10): Podem ocorrer reações alérgicas locais, limitadas ao local de aplicação em cerca de 1,5% dos pacientes. Quando o medicamento é utilizado de forma correta, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico, pois a dose recomendada é baixa. Porém, em alguns casos, quando o medicamento é usado em doses muito altas ou quando há um excesso da absorção de neomicina para o sangue20, isto pode alterar a função dos rins3, a audição e/ou o equilíbrio (sistema labiríntico). Quando o paciente já tem alteração na função dos rins13, há a possibilidade de ocorrer um acúmulo de antibióticos no sangue20, que, em alguns casos, afeta a audição. Podem ocorrer paralisias parciais dos músculos24, sensação de formigamento e dores musculares. O médico deve ser avisado quanto ao aparecimento dos seguintes sintomas23: coceira, vermelhidão corporal e/ou facial (rash)25, inchaço26 ou quaisquer sintomas23 não notados anteriormente ao tratamento e perda auditiva (casos raros). Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informar também a empresa através de seu serviço de atendimento.O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO? É pouco provável que ocorra um quadro de intoxicação com o uso do Nebaciderme®, quando as doses e a forma de aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, caso o medicamento seja usado em quantidade excessiva, lave a região imediatamente com água e sabão neutro, e seque com gaze ou pano limpo. Procure assistência médica, caso apareçam reações indesejáveis. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais orientações. Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas23, procure orientação médica. DIZERES LEGAIS Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas23 procure orientação médica. Reg. M.S. nº 1.1819.0033 Farm. Resp.: Filipe Thomas Steger - CRP-RS 10473 MULTILAB Ind. e Com. de Prod. Farm. Ltda. RS 401 - km 30 - nº 1009 - São Jerônimo - RS CEP 96700-000 - CNPJ 92.265.552/0001-40 Indústria Brasileira SAC 0800 600 0660