Click to verify

دليل تقنية الأظافر ستراير جاما 360

gamma in رغاية ما بعد الجراحة وإعادة التأهل المضاعفات المحتملة للتسمير الفحدي العكسي و gamma intramedullary مواضع الأظافر الفحدية والعاما الداخلية التقنية الجراحية للأظافر الفحدية والعاما الداخلية تتضمن المجموعة عادة gamma intramedullary عدة خطوات. أولاً ، يتم وضع المريض تحت التخدير العام ، ويتم تصور الكسر باستخدام التصوير بالأشعة السينية. بعد ذلك ، يتم عمل شق صغير في الفخذ لتعريض الكسر. بعد ذلك ، يتم إدخال مسمار داخل النخاع في الفخذ ، وتوجيهه بعناية عبر الكسر إلى الفخذ السفلي. بمجرد وضع المسمار ، يتم تثبيته في مكانه باستخدام مسامير مقفلة. يتم إغلاق الشق ، ويتم تطبيق ضمادة معقمة. يتضمن التعافي من هذا الإجراء عادة فترة من الراحة في المستشفى ، يليها علاج طبيعي لاستعادة القوة والنطاق الحركي. يعتمد الجدول الزمني للتعافي على الظروف الفردية ، ولكن يمكن للمرضى عادة البدء في المشي بمساعدة في غضون بضعة أسابيع ، والعودة إلى الأنشطة اليومية في غضون بضعة أشهر. يعتمد الشفاء على عوامل مثل عمر المريض ، وصحته العامة ، وشدة الكسر. يمكن أن تكون المضاعفات المحتملة للتسمير الفحدي العكسي و gamma intramedullary عدوى ، وتجلط الدم ، وفشل الغرسة ، وعدم التئام العظام. يعتمد الخيار بين التسمير الفحدي العكسي والعاما الداخلية على الظروف الفردية للمريض ، وتقييم الجراح للمخاطر والفوائد ، وتفضيل المريض. يعتمد الخيار بين التسمير الفحدي العكسي والعاما الداخلية على الظروف الفردية للمريض ، وتقييم الجراح للمخاطر والفوائد ، وتفضيل المريض. تتضمن التقنية الجراحية للتسمير الفحدي العكسي gamma intramedullary عدة خطوات. أولاً ، يتم وضع المريض تحت التخدير العام ، ويتم تصور الكسر باستخدام التصوير بالأشعة السينية. بعد ذلك ، يتم عمل شق صغير في الفخذ لتعريض الكسر. بعد ذلك ، يتم إدخال مسمار داخل النخاع في الفخذ ، وتوجيهه بعناية عبر الكسر إلى الفخذ السفلي. بمجرد وضع المسمار ، يتم تثبيته في مكانه باستخدام مسامير مقفلة. يتم إغلاق الشق ، ويتم تطبيق ضمادة معقمة. يتضمن التعافي من هذا الإجراء عادة فترة من الراحة في المستشفى ، يليها علاج طبيعي لاستعادة القوة والنطاق الحركي. يعتمد الجدول الزمني للتعافي على الظروف الفردية ، ولكن يمكن للمرضى عادة البدء في المشي بمساعدة في غضون بضعة أسابيع ، والعودة إلى الأنشطة اليومية في غضون بضعة أشهر. يعتمد الشفاء على عوامل مثل عمر المريض ، وصحته العامة ، وشدة الكسر. يمكن أن تكون المضاعفات المحتملة للتسمير الفحدي العكسي و gamma intramedullary عدوى ، وتجلط الدم ، وفشل الغرسة ، وعدم التئام العظام. يعتمد الخيار بين التسمير الفحدي العكسي والعاما الداخلية على الظروف الفردية للمريض ، وتقييم الجراح للمخاطر والفوائد ، وتفضيل المريض. التقنية الجراحية للأظافر الفحدية والعاما الداخلية